

Nieuwsbrief februari 2020

In deze nieuwsbrief

- **Nieuw in het assortiment**
- **Time lapse camera**
- **Lebmaagverplaatsing**
- **Castratie-actie**
- **Melkmonsters**
- **Noodslacht vs. Mobiel slachthuis**

Wist u dat?

- **Het koekompas één jaar geldig is? Er mogen uiterlijk 13 maanden tussen 2 opeenvolgende rapporten zitten**
- **Elske is vanaf 17 februari met zwangerschapsverlof.**

Nieuw in het assortiment

We hebben enkele nieuwe medicijnen in het assortiment:

- **Peniyet:** Vervanger van procapen en depocilline; geregistreerd voor alle infecties (veroorzaakt door bacteriën gevoelig voor penicillinen). WT melk 4d vlees 6d. Daarnaast hebben we procpen, dit is echter alleen geregistreerd voor navelontsteking en gewrichtsontsteking.
- **Orbenin lactation:** Eerste keus mastitis injector. Voor koeien met mastitis die niet ziek zijn; 1x per 48 uur, 3 injectoren. WT melk 4d vlees 7d.
- **Ubropen:** Eerste keus mastitis injector. Voordeel t.o.v. orbenin lactation; 1x per dag, 3-5 dagen behandelen. WT melk 6d vlees 3d.
- **Agron rood:** kant en klaar spray middel tegen uiersmet en mortellaro.
- **Intra epidine:** klauwspray tegen mortellaro met koper



Time Lapse camera



Om een goed beeld te krijgen van het gedrag / comfort van uw koeien hebben wij een time lapse camera voor u beschikbaar. Hiermee volgen we bijvoorbeeld het gedrag in de ligboxen of in de wachtruimte gedurende 24 uur. De gemaakte opname kan in 5 minuten worden bekeken en geanalyseerd voor een advies op maat.

Lebmaagverplaatsing

We hebben in december en januari bijzonder veel lebmagen geopereerd.

Lebmaagverplaatsing ontstaat wanneer er ruimte in de buik is (o.a. door een slechte pensvulling of direct na het afkalven) en er gasophoping ontstaat in de lebmaag. Bekende risicofactoren voor een slechte pensvulling zijn:

- Gedaalde eetlust a.g.v. stress of ziekte (baarmoederontsteking, melkziekte, slepende melkziekte, mastitis),
- Een tekort aan ruwe celstof, laag DS% en een hoog aandeel onbestendig eiwit in het ruwvoer (met name de kuilen van eind april begin mei zijn berucht),
- Een te hoge krachtvoergift of te snelle opbouw van krachtvoer direct na het afkalven,
- Een te abrupte verandering van het rantsoen, bijv. na afkalven of wanneer koeien voor het eerst naar buiten gaan in het weideseizoen.

Het onder controle houden van de negatieve energiebalans en het voorkomen (en effectief behandelen) van complicerende aandoeningen als (subklinische) melkziekte, baarmoederontstekingen, mastitis en kreupelheden is de beste methode om lebmaag verplaatsing te voorkomen.

Wanneer een verse koe stopt met vreten, zakt in de melkgift of sloom wordt, wacht dan niet te lang met bellen voor een afspraak. Hoe eerder we erbij zijn om een koe te opereren, hoe sneller het herstel en hoe beter de melkgift weer op gang komt.

Castratie actie

Katten in de stal vormen een risico voor de overdracht van ziekten. Ze lopen van bedrijf naar bedrijf, van de koeien naar de kalfjes en kunnen zo ziektes als salmonella, BVD, campylobacter, etc. overdragen. Wij adviseren daarom uw katten te steriliseren/castreren om te voorkomen dat er te veel over het erf rond lopen. In de maand februari kost dat €45,- voor een kater en €90,- voor een poes.

Melkmonsters

Als u een melkmonster dezelfde dag nog ingezet wilt hebben, moet het voor 9 uur gebracht worden in Wommels! De uitslag volgt dan in ieder geval de dag erna, en soms zelfs aan het einde van de dag al (we raden aan dan zelf even te bellen). De uitslag van gevoeligheidsbepaling volgt een dag later.

Noodslacht vs. Mobiel slachthuis

Om voor een noodslacht in aanmerking te komen, moet een koe aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Het dier moet een ongeval hebben gehad (de maximale tijd tussen ongeval en moment van doden is drie dagen), bijv. koe is besprongen door een tochtige koe,
2. Het dier moet gezond zijn op het ogenblik van het ongeval en het dier moet uit de wachttijd zijn. De dierenarts onderzoekt het dier vóórdát het geschoten wordt. Een dier met een afwijking (bijv. een hartprobleem of koorts) wordt afgekeurd voor de slacht.
3. Het dier is om welzijnsredenen niet geschikt voor transport.

Dieren die niet geschikt zijn voor transport, maar wel geschikt zijn voor de reguliere slacht, kunnen geslacht worden door het mobiele slachthuis van Dokkum. Denk hierbij aan een dier dat al langere tijd kreupel is vanwege een gescheurde knieband. Het dier wordt onderzocht voor een dierenarts van de NVWA en het dier wordt op uw bedrijf geschoten en verbloedt.