



# Nieuwsbrief mei 2020

## In deze nieuwsbrief

- **Visite**
- **Koe alert**
- **Gewicht melkkoe**
- **Leverbiopten**
- **Ontwormen schapen**

## Wist u dat?

- **Op 10 April is Elske moeder geworden van Job Rinse Houtsmal**

## Visites

Voor de duidelijkheid de verschillende visites die wij hanteren:

- Visite veehouderij = doorgebeld tussen 8:00 en 9:00 en geen spoed. Voor de abonenthouders zijn deze visites gratis
- Extra visite = visite doorgebeld na 9:00
- Spoedvisite = een visite die niet te lang kan wachten; hier wordt de route van de dierenarts voor aangepast of worden andere visites voor verplaatst. In principe zijn alle verlossingen spoedvisites, maar denk ook aan ernstig zieke koeien, bloedingen of prolapsen.

## Koe Alert

Veehouders die aangesloten zijn bij Friesland Campina, worden vanuit de zuivel verplicht zich aan te melden voor koe-alert. Het invullen van koe-alert dient 1x per jaar door de dierenarts te gebeuren en is vergelijkbaar met het vroegere PBB. Het invullen (achter de computer) is een paar minuten klaar.

U heeft hiervoor de tijd tot 31 december, maar we proberen dit zoveel mogelijk te combineren met het koekompas.

Voor meer informatie, zie [www.koemonitor.nl/koealert/](http://www.koemonitor.nl/koealert/)

Aanmelden kan via [koekompas.nl](http://koekompas.nl); kies vervolgens voor “koe alert” en selecteer onze praktijk (D.A.P. It Griene Hert – Wommels).

## Gewicht melkkoe

---

Een juiste schatting van het gewicht van een koe is belangrijk om over- of onderdosering van medicijnen te voorkomen. Volwassen Holsteins variëren tussen de 450 en 850 kilo. De ervaring is dat koeien qua gewicht vaak onderschat worden. De meeste dieren worden behandeld alsof ze 500kg wegen. Onderdosering van antibiotica helpt resistentievorming in de hand.

Een gemiddelde van 650 kg zou een beter uitgangspunt zijn. Meten met een meetlint is het meest betrouwbaar om een inschatting van het gewicht te krijgen en het dier juist te behandelen. Wij adviseren regelmatig een koe te meten, zodat u een goede inschatting heeft wat het gemiddelde gewicht is van de koeien op uw bedrijf.

Meetlinten zijn op praktijk te verkrijgen.



## Leverbiopten

---

Mocht u aanhoudende problemen met weerstand en/of vruchtbaarheid van uw veestapel hebben, kan dit wijzen op een probleem in de mineralenvoorziening.

We kunnen bepaalde tekorten of overmaten bij koeien aantonen met een bloedonderzoek. Helaas is dit niet voor alle elementen de meest betrouwbare methode. Bijvoorbeeld voor koper: een koper overmaat kan tot vage klachten leiden door een verminderde weerstand. In de melk en in het bloed is koper redelijk constant omdat de lever het overschot aan koper opslaat en daarmee dient als 'buffer'. De gouden standaard voor het bepalen van deze en enkele andere mineralen- en spoorelementen is het meten van de gehalten in de lever.

We kunnen dit doen door stukjes weefsel (biopten) uit de lever te nemen. De lever wordt dan met een lange naald van buiten af aangeprikt. Dit is een vrij eenvoudige ingreep die bij het staande dier is uit te voeren.

Heeft u 'vage' klachten en denkt u aan een probleem in de mineralenvoorziening? Of wilt u inzicht of de mineralenvoorziening van de koeien goed is? (moet ik meer of minder mineralen bij voeren?) Neem dan contact met ons op en we kunnen bespreken of dit onderzoek voor u zinvol is.

## Ontwormen schapen

---

In verband met toenemende resistentie tegen ontworm-middelen, moeten we hier zuinig mee om gaan. Daarom dient ontwormen alleen te gebeuren als dit noodzakelijk is, en niet preventief.

1. *Beweidingsschema:*

Middels een goed beweidingsschema wordt de wormendruk laag gehouden, waardoor ontwormen vaak niet nodig is.

- Ooien met lammeren naar buiten op schoon land (waar minimaal 3 maanden geen schapen of geiten hebben gelopen).

- Verweiden naar schoon land:

\* Elke 3 weken

\* 15 juni tot 15 september: elke 2 weken

2. *Ontwormen:*

- Alleen na mestonderzoek!!

3. *Wij adviseren mestonderzoek uit te voeren bij:*

- Lammeren: binnen vier weken nadat ze op een perceel komen waar eerder schapen en lammeren hebben gelopen.

- Ooien: alleen bij klachten (diarree, bleke slijmvliezen). In de regel ondervinden volwassen schapen geen hinder van maagdarmwormen omdat ze als lam weerstand hebben opgebouwd.

- 2 weken na het ontwormen, om te controleren of het wormmiddel heeft gewerkt, of dat er resistentie is tegen het gebruikte wormmiddel.

We adviseren om ieder jaar een ander wormmiddel te gebruiken, omdat de kans op resistentie groter is bij een middel dat al eerder is gebruikt.

Zie voor meer informatie [www.wormenwijzer.nl](http://www.wormenwijzer.nl)

Voor advies, bel gerust de praktijk.