

NORMAALWAARDEN	LAMMEREN	VOLWASSEN SCHAPEN
Ademhaling	20-30 per minuut	20-30 per minuut
Hartslag	80-120 per minuut	70-90 per minuut
Temperatuur	38,5-40,5 °C	38,5-40 °C

LAMMEREN	Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	Wachttijd in dagen (vlees)
Diarree (eerste levensweken)					
<i>Elektrolietenmix</i>	100-150 ml per keer	6-8x daags	Afhankelijk van ernst	In de bek	0d
<i>Sulfatrim tablet (cascade)</i> <i>REGNL 7849</i>	30mg/kg	2x daags		In de bek	28d
Als de lammeren niet meer drinken, dierenarts bellen voor advies. Vocht is essentieel voor de lammeren, evt. via een sonde of infuus. Belangrijk is de lammeren melk te blijven geven, afgewisseld met de elektrolietenoplossing					
Diarree*					
<i>Baycox multi</i> <i>REG NL 118580</i>	0,4 ml per kg		eenmalig	In de bek	42d
*Vanaf een leeftijd van 3 weken is coccidiose een veel voorkomende oorzaak van diarree bij lammeren. Vanaf een leeftijd van 6 weken kunnen worminfecties de oorzaak zijn. Coccidiose en een worminfectie kunnen aangetoond worden in de mest. Laat eerst mestonderzoek doen op de praktijk en behandel op basis van de uitslag!					
Ontstoken oog*					
<i>Opticlox</i> <i>REG NL 3432</i>	Enkele druppelen	3x daags	3	In het oog	0d
* Vaak is entropion (naar binnen gekrulde oogrand) de oorzaak van de ontsteking. Bel de dierenarts om een krammetje te laten plaatsen.					
Navelontsteking	<i>Gezwollen pijnlijke navel, koorts</i>				
<i>Depocilline</i> <i>REG NL 4259</i>	1 ml per 20 kg	1x daags	3	In de spier	7d

Gewrichts-ontsteking	<i>Gezwollen, pijnlijke en warme gewrichten. Koorts en kreupelheid</i>				
<i>Depocilline</i> REG NL 4259	1 ml per 20 kg	1x daags	3	In de spier	7d
Zere bekjes	<i>Korstvorming rond bek en uier</i>				
<i>Engemycine-spray</i> REG NL 102670	3 sec sprayen	2x daags	3	Op de huid	0d
Bij ernstige gevallen: bel de dierenarts. Vaccineren tegen zere bekjes is mogelijk.					
Longontsteking	<i>Pompende ademhaling, koorts, sloom</i>				
<i>Florkem (cascade)</i> REG NL 102429	1 ml per 15 kg	Na 48 uur herhalen	2 maal spuiten	In de spier	37d
<i>Alamycine LA200</i> REG NL 2738	1ml/10kg	Eenmalig		In de spier	35d
Pijnstilling					
<i>Novem 20 (cascade)*</i> REG NL 10219	0,5 ml per 20 kg	1x per 3 dagen	1	Onder de huid	28d
*Novem werkt tevens als ontstekingsremmer, dus wordt ook geadviseerd bij navelontsteking, gewrichtsontsteking en longontsteking.					

OOIEN	Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	Wachttijd in dagen (vlees)
Zwaar aflammeren	<i>Bij langdurig manipuleren of overmatig bloedverlies na aflammeren</i>				
<i>Depocilline</i> REG NL 4259	1 ml/20 kg	1x daags	3	In de spier	7d
<i>Oxytocine*</i> REG NL 113626	2 ml/dier	Evt. elke 2 uur		In de spier	0d
* oxytocine zorgt ervoor dat de baarmoeder krimpt. Later dan 24uur na aflammeren, heeft oxytocine spuiten geen zin meer					
Abortus	Overleg met de dierenarts bij méér abortus gevallen dan normaal of wenselijk				
Diarree	Laat altijd mest onderzoek doen, diarree bij volwassen schapen wordt vaak veroorzaakt door worminfecties.				
Uierontsteking	<i>Hard en pijnlijk uier, koorts</i>				
<i>AlamycineLA200</i> REG NL 2738	1ml/10kg	Eenmalig	3	In de spier	35d
<i>Mamyzin (cascade)</i> REG NL 8652	10 ml	1x daags		In de spier	28d
Blauw uier					

Ernstige vorm van mastitis waarbij een uierhelft blauw en koud wordt. Bel dierenarts voor overleg.

Baarmoederontsteking	<i>Koorts, sloom, verminderde eetlust. Stinkende uitvloeijing of aan nageboorte blijven staan</i>				
<i>AlamycineLA200 REG NL 2738</i>	1ml/10kg	Eenmalig		In de spier	35d
Ontstoken wond	<i>Bij ontstoken wonden is de preventie van myiasis (madenziekte) belangrijk</i>				
<i>Engemycine-spray REG NL 102670</i>	3 sec sprayen	2x daags	3	Op de huid	0d
<i>Depocilline REG NL 4259</i>	1 ml per 20 kg	1x daags	3	In de spier	7d
<i>Clik 5% pour on REG NL 9938</i>	Zie verpakking	1x/16 weken		Op de huid	40d
Slepende melkziekte	<i>Sloom, slecht vreten, liggerig. Voor het aflammeren</i>				
<i>Propyleenglycol REG NL 9777</i>	30 ml/dier	2x daags	4	In de bek	0d
<i>Catosal (cascade) REG NL 6025</i>	10ml/dier	1x daags	3	In de spier	0d
<i>Calcitat50 (cascade) REG NL 3745</i>	10ml/dier	1x daags		Onder de huid	28d
Bij ernstige slepende melkziekte; bel de dierenarts. Het kan nodig zijn een infuus met glucose te geven of de geboorte op te wekken.					
Rotkreupel	<i>Kreupel lopen, stinkende ontsteking tussen de klauwtjes</i>				
<i>Engemycine-spray REG NL 102670</i>	3 sec sprayen	2x daags	3	Op de huid	0d
Bij ernstige gevallen, bel de dierenarts voor een (koppel) advies op maat					
Oogontsteking	<i>Tranend oog, soms pussig of pijnlijk</i>				
<i>Opticlox REG NL 3432</i>	Enkele druppelen	3x daags	3	In het oog	0d
Pijnstilling					
<i>Novem 20 (cascade) * REG NL 10219</i>	0,5ml/20 kg	1x per 3 dagen	1	Onder de huid	28d
*Novem werkt tevens als ontstekingsremmer en wordt ook geadviseerd bij longontsteking, zware verlossingen, rotkreupel en uierontstekingen.					

ONTWORMEN

Behandelen altijd op basis van mestonderzoek. Onnodig behandelen kost niet alleen geld, maar werkt ook resistentie tegen wormmiddelen in de hand.

Soorten wormen:

- **Nematodirus Battus**; geeft waterdunne diarree, vooral in het voorjaar bij de lammeren. Dieren hebben dorst en een vieze achterhand.
- **Haemonchus contortus**: geeft bloedarmoede en bleke slijmvliezen. Geen diarree! Vooral klachten in juli en augustus
- **Teladorsagia/ tristrongylus**: geven diarree, in zomer en najaar

Behandeladviezen;

- Overleg met de dierenarts over het te gebruiken middel
- Kies de juiste dosering, weeg schapen eventueel!
- Laat 5% van de koppel onbehandeld (de beste dieren of ooiën met een eenling)
- Controleer effectiviteit van behandeling 10-14 dagen na behandeling met een nieuw mestonderzoek
- Om problemen met wormeninfectie en resistentie te voorkomen, adviseren wij een degelijk omweidings-plan op te stellen: tot 1 juli iedere 3 weken op een schoon stuk land brengen, tot 1 september elke 2 weken omweiden naar schoon land.

Ontwormingsmiddelen

Alleen gebruiken op basis van mestonderzoek!

Werkzaam tegen maagdarmwormen, tenzij anders vermeldt

	Dosering	Frequentie per dag	Duur in aantal dagen	Toedieningswijze	Wachttijd in dagen (vlees)
<i>Noromectin drench</i> REG NL 09568	2.5ml/10kg	1x	Eenmalig	Oraal	14d
<i>Cydectin 0,1%</i> REG NL 8660	1ml/5kg	1x	Eenmalig	Oraal	14d
<i>Bovex</i> REG NL 8863	1ml/5kg	1x	eenmalig	Oraal	24d
<i>Eprinex multi</i> REG NL 123108	1ml/10kg	1x	Eenmalig	Over de rug	2d
<i>Werkt ook tegen vliegen, mijten en luizen</i>					
<i>Dectomax</i> REG NL 9844	1ml/50kg	1x	Eenmalig	In de spier	70d
<i>Ook werkzaam tegen luizen en mijten</i>					
<i>Endex</i> REG NL 7978	1ml/5kg	1x	eenmalig	oraal	42d
<i>Ook werkzaam tegen leverbot. Niet werkzaam tegen larven rode lebmaagworm</i>					
<i>Fasinex</i> REG NL 7980	1ml/5kg	1x	Eenmalig	Oraal	42d

Alleen bij leverbot

